

COMUNICACIÓN DIRIGIDA A PROFESIONALES SANITARIOS

4 de Noviembre de 2014

OLIMEL/PERIOLIMEL – Errores de medicación: recordatorio acerca de la importancia de una correcta preparación y administración

Estimado Profesional Sanitario,

Para prevenir errores en la preparación y administración de Olimel/PeriOlimel y un posible daño a los pacientes, Baxter S.L., de acuerdo con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), desea informarle de lo siguiente:

Resumen

- Se han notificado errores durante el uso de Olimel/PeriOlimel relacionados con la falta de “activación” (mezclado) o a una “activación” incompleta de los compartimentos de la bolsa, u otros tipos de errores de medicación, tales como velocidad de infusión excesiva o vía de administración incorrecta.
- Se **DEBEN** seguir cuidadosamente las instrucciones para la preparación y la administración de Olimel/PeriOlimel tal como se describen en la información del producto (ficha técnica y prospecto), para prevenir que se produzca una activación incompleta de la bolsa antes de la administración, u otros errores de medicación.
- Todas las formulaciones de Olimel deben administrarse solo por vía intravenosa central. Únicamente PeriOlimel N4E puede ser administrada también por vía intravenosa periférica debido a su osmolaridad (760 mOsm/l).
- El póster adjunto es una guía recordatoria para los profesionales sanitarios e ilustra el modo correcto de usar Olimel/PeriOlimel con objeto de evitar estos errores de medicación (Anexo 1).

Información adicional

Olimel/PeriOlimel son productos indicados para nutrición parenteral (NP) de adultos y niños mayores de 2 años cuando la alimentación oral o enteral es imposible, insuficiente o está contraindicada.

